

Appareil fixé sur deux bagues



Les jours suivant la mise en place de l'appareil, les dents seront mobiles et sensibles à la pression. Cette gêne provient de la tension, elle se dissipera au bout de 4 à 5 jours. En cas de douleurs trop fortes un analgésique qu'on peut obtenir en pharmacie peu aider.

Environ toute les 8 semaines, nous activons l'appareil, cette tension réapparaîtra, mais seulement pour une durée plus brève.

Recommandations :

- ☺ Durant les 24 heures qui suivent la pose de ton appareil, nous recommandons alimentation plutôt liquide et pas trop chaude.
- ☺ Durant tout le traitement, ne pas ronger les ongles, ne pas mâchonner de crayons ou d'objets similaires, ne pas toucher les appareils avec les doigts.

L'appareil est suffisamment robuste pour résister à la mastication normale des aliments, mais il n'est pas indestructible; néanmoins, **deux types de nourriture doivent être évités :**

1. Les aliments très durs

Ils peuvent causer des dégâts en pliant les fils et en cassant le ciment placé sous les bagues, ceux-ci peuvent se décoller par la suite.

Ce qu'il faut éviter:

- mordre dans des carottes crues entières, mieux vaut les débiter en morceaux
- mordre dans les pommes entières, mais couper en petits quartiers
- manger du pain dur (attention aux sandwiches)
- ronger les ongles
- utiliser tes dents pour ouvrir des noix, noisettes, cacahuètes, bouteilles, etc...

2. Les aliments collants

Ils sont dangereux à double titre, car, en plus de leur haute teneur en sucre, ils peuvent tordre les fils, mais surtout décoller les bagues.

Ce qu'il faut éviter:

- les chewing-gums
- les caramels (Carambar, Sugus, etc ...)
- Le nougat

Les bonbons durs et sans sucre sont permis, à condition de ne pas les croquer mais les sucer

Les aliments à haute teneur en sucre sont néfastes, ils transforment les bactéries de la bouche en acide et cet acide provoque la carie. On peut manger du chocolat et des sucreries, mais après les repas principaux en guise de dessert et suivi d'un brossage des dents.



Un **brossage** des dents et des gencives après chaque repas évite des caries et des inflammations des gencives. Le soir, en plus du brossage, les petites brochettes Candida que nous avons données, aident à éliminer les restes alimentaires et de plaque dentaire qui se coincent à l'appareil, suivi d'un rinçage d'eau fluorée.

Si des parties de l'appareillage irritent les joues ou la langue elles peuvent être couvertes avec de la cire que nous avons donnée. S'il n'y a pas de la cire à disposition, un bout de chewing-gum collé par-dessus peut dépanner.

En se conformant à nos conseils, ça sera un plaisir de voir les dents prendre la position désirée dans les délais prévus. La coopération est l'essentiel du traitement, elle détermine la durée et la réussite de nos efforts communs.